

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE

ACTIVE <GRANULES>

第二类医药品
肠胃药

◆大正汉方肠胃药ACTIVE<细颗粒>是一种针对因年龄等原因引起的胃胀等症状有效的肠胃药。◆通过安中散和四逆散的组合，提高因自律神经紊乱而造成胃功能下降，恢复胃动力，改善胃胀症状。◆通过独家制剂技术使产品具有良好的香气和风味（配合了芳香性健胃生药）。

效能或效果

体力中等、或微弱，偶尔有胸部腹部的闷重感、且有不妥、失眠、生气等症状的人的下述各种症状：胃胀、胃部不适感、胃痛、打嗝、食欲不振、胃部腹部胀满感、胸闷、烧心、胃酸过多、腹痛、恶心（想吐、恶心）、神经性胃炎

用法及用量

在饭前或饭后，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天3次，1次1包

未满15岁，不宜服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。

成分及分量

1包（1.4g）中

Anchusan 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Ryokyo)

Shigyakusan Dry Extract 303.33mg (equivalent to 333.33mg of Bupleurum root, 333.33mg of Immature orange, 333.33mg of Peony root, 166.67mg of Glycyrrhiza)

添加剂

Dextrin, anhydrous silicic acid, Powdered sugar, cellulose, Hydroxypropylcellulose, Sucralose, Talc

〔注意〕

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。

身体虚弱人群（体力不足、身体虚弱的人群）。

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

●若服用1周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任