

大正漢方胃腸薬アクティブ<錠剤>

◆大正漢方胃腸薬アクティブ<錠剤>は、年齢などによる胃のもたれ等に効く胃腸薬です。◆安中散と四逆散の組み合わせにより、自律神経が乱れて低下した胃の機能を高め、胃を元気にして、胃もたれを改善します。◆独自の製剤技術により、香り・風味が良い製剤を実現しました（芳香性健胃生薬配合）。

効能・効果

体力中等度、又はやや虚弱で、ときに胸腹部の重くるしさ、不安・不眠・いらだち等の症状がある方の次の諸症：胃のもたれ、胃部不快感、胃痛、げっぷ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ、胃酸過多、腹痛、吐き気（むかつき、恶心）、神経性胃炎

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

15才以上、1回4錠、1日3回

15才未満、服用しないこと

注意

定められた用法・用量を厳守してください。

ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）

びんの中の包装紙に包まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

成分及び分量

4錠中

安中散 700mg (ケヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg)

四逆散乾燥エキス 303.33mg (サイコ・キジツ・シャクヤク各333.33mg, カンゾウ166.67mg)

添加物

デキストリン, 無水ケイ酸, リン酸水素Ca, クロスカルメロースナトリウム, ステアリン酸マグネシウム, 硬化油

注意

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

使用上の注意

相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人。

妊娠又は妊娠していると思われる人。

今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

●1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヶ月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。