

# TAISHO STOMATITIS OINTMENT QUICK CARE

指定第二类医药品  
口腔溃疡药

◆口腔溃疡软膏大正Quick Care是以口腔溃疡为治疗目的开发的软膏。对患处的紧密性良好，即使在口腔内部也会长时间覆盖患处。■“口腔溃疡（口疮性）”是…在脸颊内侧或舌头、嘴唇的内侧等出现1~几个周围偏红、中心部为稍微凹陷的白色圆形、并伴有痛感的浅而小的溃疡（直径小于10mm）的炎症的统称。原因不明，一般认为与压力、疲劳、以及营养摄取不均衡相关。

## 效能或效果

口腔溃疡（口疮性）

## 用法及用量

1天1~数次，请取适量涂抹于患处。  
请严格遵守规定的用法用量。  
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。  
本药剂仅限用于口腔，请不要用于口腔以外的部位。  
请不要用于假牙的连接等治疗以外的目的。  
如果痛感消失，请停止使用。

## 成分及分量

100 g 中  
Triamcinolone Acetonide 0.1g

## 添加剂

Xylitol ,Carboxyvinyl polymer,Hypromellose,Hydrocarbon gel,flavor,l-Menthol

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）  
下述人群请不要使用。  
疑似感染性口腔溃疡的人群  
用纱布等擦拭可以容易脱落的白斑蔓延在整个口腔内部的人群。（可能患有念珠菌性感染症）  
患处伴有黄色脓状物的人群。（可能患有细菌感染症）  
口腔内部多发米粒大小~小豆大小水泡的人群、口腔粘膜以外的嘴唇、皮肤上也有水泡、起疹的人。（可能患有病毒感染症）  
出现发烧、食欲不振、全身倦怠感、淋巴结的肿胀等全身症状的人群。（可能患有病毒感染症）  
口腔内部伴有感染的人群。  
（有报告称因使用类固醇剂导致感染症恶化，因此请勿用于牙槽脓肿、牙龈炎等口腔内部有感染的部位）  
使用5天仍不见症状改善的人群。  
使用1~2天出现症状恶化的人群。

### 咨询事项

●以下人群在使用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师或牙科医师治疗的人群  
因药物等出现过过敏症状的人群  
孕妇或有其可能性的人群  
哺乳期人群  
患处范围较大的人群。  
老年人  
●使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者  
口腔内部：白斑（可能患有念珠菌性感染症）、患处伴有黄色脓状物（可能患有细菌感染症）  
其他：过敏症状（支气管哮喘发作、浮肿等）  
使用本药剂后，如果出现下述症状，可能是感染症引起的口腔溃疡或其他疾病引起的口腔溃疡，此时请停止使用，并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者  
发烧  
食欲不振、全身倦怠感、淋巴结肿胀、水泡（口腔内部以外）、口腔内的患处广范围蔓延、眼睛疼痛、视线模糊、外外部溃疡  
起疹、发红  
发痒

## 保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。  
请保管在儿童无法触及的地方。  
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）  
请勿使用超过使用期限的产品。  
且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任