

口内炎軟膏大正A

◆口内炎軟膏大正Aは、口内炎・口角炎などの治療を目的として開発した軟膏です。患部への密着性が良く、口腔内であっても長時間患部を覆います。

効能・効果

口唇のひびわれ・ただれ、口内炎、舌炎
口角炎、口唇炎

用法・用量

患部に、適量を1日2～4回塗布してください。
定められた用法・用量を厳守してください。
患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
口内又は口唇にのみ使用してください。
同じ部位に他の外用剤との併用は避けてください。

成分及び分量

100g中
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.1g
アラントイン 0.5g

添加物

キシリトール、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)、ゲル化炭化水素、香料、l-メントール

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。
ただれのひどい患部。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師又は歯科医師の治療を受けている人。
乳幼児。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：
口腔
発疹・発赤
かゆみ
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい所に(密栓して)保管すること。
小児の手のとどかない所に保管してください。
他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

31

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者(又は当社)による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者(又は当社)は一切の責任を負いかねます。