

TAISHO STOMATITIS PATCH QUICK CARE

指定第二類醫藥品
口腔炎治療藥

◆大正Quick Care口腔炎貼片為「黏貼型」的口腔炎治療藥。對口腔內部具優異貼合力，確實包覆患部，避免刺激且有效成分持續作用。□

療效或效果

口腔炎（口瘡）

用法及用量

成人（15歲以上）

兒童（5歲以上）

每患處1次1張，1天1~2次，請貼在患處黏膜使用。

未滿5歲者

不可使用

請務必遵守規定用法、用量。

本藥劑並不會溶解。經過一段時間將自然剝落。（請勿用力撕除）

本藥劑為口腔黏膜貼片，請勿內服。

疼痛消失後請結束使用。（使用時的貼片無須刻意撕除）

未滿5歲的嬰幼兒不得使用。

5歲以上兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

兒童使用時，貼片後兒童可能以手指將其撕除，敬請多加留意。

如不慎吞食，請黏貼新貼片於患部。萬一症狀出現變化或感到不安時，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者。

如以不正確的方法使用將使藥劑無法確實黏貼，請詳讀使用方法並正確使用。

本藥劑黏貼於患部黏膜後，如以舌頭等用力接觸，可能造成貼片剝落，敬請留意。

貼片剝落後，請丟棄，勿吞食。

成分及分量

1張（1個貼片）中

Triamcinolone Acetonide 0.025mg

添加劑

Polyacrylic acid, Triethyl citrate, Hypromellose, Ethylcellulose, Castor oil, Titanium oxide, New coccine

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

符合下列情形者請勿使用。

可能罹患感染性口腔炎者

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

用紗布等擦拭後很容易就剝落的白斑於整個口腔內擴散者。（可能罹患念珠菌感染症）

患處有黃色膿瘡者。（可能罹患細菌感染症）

口腔內長出很多米粒般至紅豆般大小的小水疱者；口腔黏膜以外的嘴唇及皮膚亦有水疱及出疹者。（可能罹患病毒感染症）

發燒、食慾不振、全身倦怠、淋巴節腫大等有全身症狀者。（可能罹患病毒感染症）

伴隨口腔感染者。

（曾有報告指出使用類固醇而出現感染症惡化的病例，因此請勿用於齒槽膿漏、牙齦炎等口腔感染部位）

使用5天症狀仍未見改善者。

使用1~2天症狀惡化者。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

患部為廣範圍的人。

年長者。

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

其他：過敏症狀（支氣管氣喘發作、浮腫等）

使用本藥劑後，如出現以下症狀，有機會因細菌感染引起口腔潰瘍或由其他疾病引起口腔潰瘍，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

口腔內：白斑（可能罹患念珠菌感染症）、患部出現黃色膿瘡者（可能罹患細菌感染症）

發燒

食慾不振、全身倦怠、淋巴節腫大、水疱（口腔內以外）、口腔內患部蔓延至大範圍、眼睛疼痛、視力模糊、外陰部潰瘍

發疹、發紅
發癢

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

為確保品質，開封後未使用部分請裝回原包裝外袋，將開封口壓折保管。

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)

21

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。