

## 효능 또는 효과

영유아의 발육기·편식아·병중병후·발열성 소모성 질환·식욕부진·영양장애 등의 경우의 영양보급  
자양강장  
허약 체질

## 용법 및 용량

5~14세 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오.  
5세 미만, 복용하지 말 것  
정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.  
(다른 비타민 등을 함유하는 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)  
소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.

## 성분 및 분량

In 1 bottle (50 mL)  
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 800mg  
Thiamine nitrate 3mg  
Riboflavin sodium phosphate 3mg  
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) 6mg  
Calcium Gluconate Hydrate 450mg  
Nicotinamide 20mg  
Carnitine hydrochloride 50mg

## 첨가물

Sugar,Glucose,Sucralose ,citric acid,Sodium citrate,pH adjusting agent,Propyl gallate,Caramel,Benzoic acid,flavor,Glycerin,Vanillin,,

## 성분 및 분량에 관한 주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 Vitamin B2가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

## 사용상의 주의

### 상담할 내용

다음과 같은 경우는 즉시 복용을 중단하고 이 제품을 지참한 후 의사 또는 약사와 상담하십시오.  
복용 후, 다음의 증상이 나타난 경우  
피부:  
발진  
소화기:  
위부 불편감  
한동안 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우  
다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이 같은 증상이 계속되거나 증강될 경우는, 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.  
설사

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.  
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

21

### 【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..