

LIPOVITAN Life

◆維持體力、消解疲勞

療效

- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★恢復及預防疲勞
- ★改善及預防虛弱體質（包括隨年齡增加而變得身體虛弱）引起的身體不適：肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、肌力低下、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳（皮膚粗糙、皮膚乾燥）、骨質及牙齒的衰退
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適：因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人（15 歲以上）1 天 1 次，每次 1 瓶（100mL）。
未滿 15 歲者，請勿使用。

注意事項

請務必遵守規定用法、用量。（若服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量）

成分

100mL 中
牛磺酸 1500mg
L-α-氨基異戊酸 80mg
白氨酸 240mg
L-異白氨酸 100mg
L-精氨酸鹽酸鹽 300mg
蜂王漿 200mg
硝酸硫胺（維生素 B₁） 5mg
核黃素磷酸鈉（維生素 B₂） 5mg
鹽酸吡哆辛（維生素 B₆） 10mg
菸鹼醯胺 20mg
肌醇 50mg
無水咖啡因 50mg

添加劑

白糖，D-山梨醇，普維酮，苯甲酸钠，檸檬酸，檸檬酸鈉，pH 調節劑，香料，甘油，香蘭素，l-薄荷腦

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹
消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

41

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。

- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。