LIPOVITAN D LIGHT

지정 의약품

【사용 시 주의사항】

상담

1. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용이 발생할 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오
피부: 발진/소화기: 위 불쾌감
2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 증세가 심해지면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오
설사
3. 얼마 동안 복용해도 증상이 좋아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오

【효능】

- ☆체력, 신체 저항력 또는 집중력의 유지·개선
- ☆피로 회복 및 예방
- ☆허약 체질(노화로 인한 신체 허약 포함)에 따른 신체 기능 저하의 개선·예방: 뼈 또는 치아 약화
- ☆일상 생활에서의 영양 부족에 따른 신체 기능 저하 개선·예방: 어깨·목·허리 또는 무릎의 기능 저하, 쉽게 피곤함, 피로감이 남음, 체력 부족, 몸이 무거움, 몸이 늘어짐, 피부 상태가 좋지 않음(거친 피부, 피부 건조), 숙취로 인한 식욕 저하, 늘어짐, 눈 피로
- ☆아플 때나 아픈 후 체력 저하 시, 발열을 동반한 소모성 질환 시, 식욕 부진 시, 임신수유기 또는 출산 전후의 영양 보충

【용법·용량】

성인(15세 이상)은 하루 한 번 100mL(1병)씩 복용하십시오.

※15세 미만은 복용하지 마십시오.

【주의】

정해진 용법 및 용량을 반드시 지켜주십시오. (다른 비타민이 함유된 제품을 동시에 복용할 경우에는 과잉 섭취에 주의하십시오)

【성분】 100mL 중

타우린	1000mg	리보플라빈 인산에스테르나트륨(비타민 B ₂)	5mg
이노시톨	50mg	피리독신 염산염(비타민 B ₆)	5mg
니코틴산아미드	20mg	무수 카페인	50mg
티아민 질산염(비타민 B ₁)	5mg		

첨가물: 백당, D-소르비톨, 안식향산나트륨, 구연산, 향료, 글리세린, 바닐린

【주의】

본 약제를 복용하면 소변이 노란색으로 변할 수 있지만 이것은 본 약제 중 비타민 B₂에 의한 것이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

【보관 및 취급 시 주의사항】

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

1개당 58kcal

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.