

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

## タウリン、巴戟天、ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>配合

# リポビタンD PRO

リポビタンD PRO

第2類医薬品

### ⚠ 【使用上の注意】

相談すること



- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体质

### 【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15歳未満は服用しないでください。

#### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生葉成分を含むため、まれに沈でんを生じることがあります、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

### 【成 分】 100mL 中

タウリン	.....	1000mg
ハゲキテン流エキス	.....	0.2mL (巴戟天 200mg に相当)
イノシトール	.....	50mg
ニコチン酸アミド	.....	20mg
チアミン硝化物 (ビタミンB <sub>1</sub> )	.....	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB <sub>2</sub> )	.....	5mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	.....	5mg
無水カフェイン	.....	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、精製ステビア抽出物、ポビドン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、グリセリン、アルコール、バニリン（アルコール0.2mL以下）

#### 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

大正製薬<sup>41</sup> 株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——