リポビタンゴールドX
服用に際しては、説明書きをよく読んでください。
【使用上の注意】相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹/消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
【成 分】1本(50mL)中 タウリン1500mg、ローヤルゼリー200mg、ハンピチンキ0.1mL(反鼻20mgに相当)、サンヤク流エキス-A 0.1mL(山薬100mgに相当)、レマネジン85 50mg(信黄100mgに相当)、チアミン脂肪酸(ビタミンB1) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 3mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、ニコチン酸アミド20mg、イノシトール50mg、無水カフェイン50mg 添加物：白糖、D-ソルビトール、ポビドン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、グリセリン、バニリン
[注 意] 本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません。
【効 能】★肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊産婦授乳期などの場合の栄養補給 ★滋養強壮 ★虚弱体質
【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。※15才未満は服用しないでください。
[注 意](1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに次ぐみ、を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
大正製薬(株)お客様119番室 電話03-3985-1800

製造番号
使用期限
(西暦年月)

第3類医薬品

滋養強壮・栄養補給
リポビタンゴールドX

50mL

大正製薬株式会社[31]
東京都豊島区高田3丁目24番1号

倍率見本 0.85倍

副作用被害
救済制度
0120-149-931

ガラス：瓶
金属：キャップ
★キャップと瓶は分別して捨ててください
1本あたり52kcal
NP-11