

## 효능 또는 효과

육체 피로·병증 및 병후·영양 장애·발열성 소모성 질환  
식욕 부진  
임신 수유기 등의 경우의 영양공급  
자양강장  
허약 체질

## 용법 및 용량

성인(15세 이상) 1일 1회 1병(100mL)을 복용하십시오.  
15세 미만, 복용하지 말 것  
정해진 용법·용량을 염수해 주십시오.  
(다른 비타민 등을 함유하는 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)  
본제는 생약 성분을 포함하므로 드물게 침전물이 생길 수 있지만, 약효는 변함 없습니다.  
잘 흔들어서 복용하십시오.

## 성분 및 분량

In 100 mL  
Taurine (aminoethyl sulfonic acid) 1500mg  
Royal jelly 100mg  
Whitethorn extract S 12.5mg  
Lycium Fruit Fluid Extract 0.2mL  
Thiamine nitrate 10mg  
Riboflavin sodium phosphate 5mg  
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) 5mg  
Nicotinamide 20mg  
Inositol 100mg  
Anhydrous caffeine 50mg

## 첨가물

Erythritol ,Acesulfame K,Sucralose ,Stevia extract,citric acid,Sodium citrate,Povidone ,Propyl gallate,Sodium benzoate,flavor,Vitamin E ,D-Sorbitol ,Glycerin,l-Menthol,Alcohol (not more than 0.15 mL),,

## 성분 및 분량에 관한 주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 Vitamin B2가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

## 사용상의 주의

### 상담할 내용

복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

피부:

발진

소화기:

위부 불쾌감

복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.□

설사

한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

**【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】**

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..