

LIPOVITAN fine

◆感到疲倦時

療效

- ★恢復及預防疲勞
- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適：容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)、眼睛疲勞、肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感
- ★改善及預防虛弱體質(包括隨年齡增加而變得身體虛弱)引起的身體不適：骨質及牙齒的衰退
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人(15歲以上)請1天1次1瓶(100mL)服用。
未滿15歲者，請勿使用。

注意事項

請務必遵守規定用法、用量。(若服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量)

成分

100mL 中

牛磺酸 1000mg

硝酸硫胺(維生素 B₁) 5mg

核黃素磷酸鈉(維生素 B₂) 10mg

鹽酸吡哆辛(維生素 B₆) 10mg

菸鹼醯胺 20mg

肉鹼鹽酸鹽 10mg

無水咖啡因 50mg

添加劑

赤蘚醇，醋磺內酯鉀，甜菊萃取精華，三氯蔗糖，檸檬酸，檸檬酸鈉，沒食子酸丙酯，苯甲酸钠，香料，維生素 E，香蘭素

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹
消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

21

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。