

LIPOVITAN ZERO

指定醫藥部外品

【使用上的注意事項】

諮詢事項

1.服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：出疹 / 消化器官：胃部不適感

2.服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

3.若服用一段時間症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

【療效】

★恢復及預防疲勞

★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力

★改善及預防日常生活中因營養不良而引起的身體不適：肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳（皮膚粗糙、皮膚乾燥）、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞

★改善及預防虛弱體質（包括隨年齡增加而變得身體虛弱。）引起的身體不適：骨質及牙齒的衰退

★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾病時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

【用法及用量】

成人（15歲以上）1天1次1瓶（100mL）。

※未滿15歲請勿服用。

【注意】

請務必遵守規定用法、用量。（若同時服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量）

【成分】 100mL 中

牛磺酸	1000mg	鹽酸吡哆辛（維生素 B ₆ ）	5mg
肉鹼鹽酸鹽	30mg	菸鹼醯胺	20mg
硝酸硫胺（維生素 B ₁ ）	5mg	無水咖啡因	50mg
核黃素磷酸鈉（維生素 B ₂ ）	5mg		

添加物：D-山梨醇、赤藻糖醇、氯化鈉、醋磺內酯鉀、精製甜菊萃取物、三氯蔗糖、檸檬酸、檸檬酸鈉、沒食子酸丙酯、苯甲酸鈉、香料、甘油、香蘭素

【注意】

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

【保管及使用上的注意事項】

(1)請保管於陰涼處，避免日光直射。

(2)請置於兒童無法觸及之處保管。

(3)請勿服用超過使用期限的產品。

每瓶 16kcal

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。