

指定医薬部外品 販売名:リポビタンtb

服用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠	1日1回
15才未満	服用しないこと	

〔注意〕(1)定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含む製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)(2)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色の原因となり、品質が変わることがあります)(3)びんの中の包装紙に包まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

成 分 (3錠中)


タウリン……………500mg
チアミン硝化物(ビタミンB1)……………10mg
リポフラビン(ビタミンB2)……………5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)……………5mg
アスコルビン酸カルシウム……………100mg
(ビタミンCとして82.6mg)
カルニチン塩化物……………10mg
グリシン……………5mg
サンヤク末……………10mg
シゴカ乾燥エキス……………8mg
(シゴカ 200mgに相当)

添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒドロメロス、三酸化鉄、カルナウバロウ

〔注意〕(1)本剤は、生薬を用いた製品ですから、製品により色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。(2)本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、心配ありません。



製品情報はこちら



識別コード

開封 年 月 日

エコパッケージ
添付文書をなくし、紙の使用量を削減(従来品比)

キャップを開けた際、ピンの口もとのシールが破れていたり、はがれている場合は服用しないでください。

効 能

- ★疲労の回復・予防
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
- ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)

〈最初に服用する時に〉
①瓶口シールをはがして捨ててください。②詰め物を取り出して捨ててください。(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れると、異物混入の原因になることがあります)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
https://www.taisho.co.jp/

お客様
119番室

03-3985-1800
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

製造番号
使用期限
(西暦年月)



指定医薬部外品 270錠

疲労回復・予防
栄養補給

リポビタン
DX

ノン
カフェイン

寝る前にも

開封口



タウリン +

グリシン
睡眠サポート成分

疲労回復・予防
栄養補給

リポビタン
DX

栄養の偏りによる睡眠の悩みに

毎日感じるその疲れに

※寝つきの悪さや眠りの浅さ

小さくて

飲みやすい

指定医薬部外品

270錠 (90日分)

リポビタンDX

270錠



キャップ:PP

詰め物:PE

ガラス:瓶

金属:瓶口シール



紙箱



倍率見本 1.00倍



エネルギーサイクルに働きかけて、
からだ全体の疲れに効く！

Q. 毎日飲んでいいですか？

A. 日々の疲労回復・予防などに
毎日服用いただけます。

※しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、
医師・薬剤師又は登録販売者に相談してください

Q & A

Q. カフェインは入っていますか？

A. 入っていません。
寝る前にもおすすめです。



疲れを回復・
予防したい

こんな時にも



栄養の偏りによる眠りの浅さ・
目覚めの悪さを改善したい

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚:発疹/消化器:胃部不快感 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢 3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。