

リポビタン DX

- ◆リポビタン DXには、生活者の疲労に寄り添ってきたリポビタンシリーズのベース処方であるタウリン、ビタミン B 群（ビタミン B₁、B₂、B₆）にビタミン C とアミノ酸、生薬を配合しています。1 日 1 回の服用で日常生活の中で感じる「疲労」にすぐれた効果を発揮します。
- ◆タウリン、ビタミン B 群は三大栄養素である糖質・脂質・タンパク質をエネルギーへ変換するのを助けます。
- ◆「疲労の回復・予防」の効能効果が認められたリポビタンシリーズの錠剤で、明るく元気に、アクティブに過ごすために活用していただきたい製品です。

効能

- ☆疲労の回復・予防
- ☆日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
肩・首・腰又は膝の不調
二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ
寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い
肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）
- ☆体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ☆虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
肩・首・腰又は膝の不調
寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い
肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）
- ☆病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。
成人（15 才以上）、1 回 3 錠、1 日 1 回
15 才未満、服用しないこと

注意

- ・定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- ・ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色の原因となり、品質が変わることがあります）

成分

3 錠中
タウリン 500mg
チアミン硝化物（ビタミン B₁） 10mg
リボフラビン（ビタミン B₂） 5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B₆） 5mg
アスコルビン酸カルシウム 100mg（ビタミン C として 82.6mg）
カルニチン塩化物 10mg
グリシン 5mg
サンヤク末 10mg
シゴカ乾燥エキス 8mg（シゴカ 200mg に相当）

添加物

無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナウバロウ

注意

- ・本剤は、生薬を用いた製品ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。
- ・本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹
消化器：胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。