

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

疲労回復・体力維持に

リポビタン DX アミノ


販売名:リポビタンtm

〈ビタミン含有保健剤〉
指定医薬部外品

◆リポビタンDX アミノには、生活者の疲労に寄り添ってきたリポビタンシリーズのベース処方であるタウリン、ビタミンB₁、B₂、B₆に加えて、BCAA*(バリン、ロイシン、イソロイシン)、アルギニンなどのアミノ酸、カルシウムを配合しています。1日1回の服用で日常生活の中で感じる「疲労」にすぐれた効果を発揮します。

*分岐鎖アミノ酸

- ◆加齢に伴う筋力の低下の改善・予防にも効果を発揮します。
◆特に「年齢とともに疲れやすくなったり、筋力が低下してきた」と感じる中高年の方に、日々明るく元気に、アクティブに過ごすために活用していただきたい製品です。



使用上の注意



相談すること



- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 胃部不快感 |

- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

- ③ しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

★疲労の回復・予防

★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防

- ◇筋力の低下
- ◇疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
- ◇肩・首・腰又は膝の不調
- ◇骨又は歯の衰え

★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善

★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防

- ◇筋力の低下
- ◇疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
- ◇肩・首・腰又は膝の不調

★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

| 年令 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|---------|------|
| 成人(15才以上) | 3錠 | 1日1回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)
- (2)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色の原因となり、品質が変わることがあります)
- (3)びんの中の包装紙に包まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

最初に服用する時に

- ①瓶口シールをはがして捨ててください。
- ②詰め物を取り出して捨ててください。
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



成 分

3錠中

| 成 分 | 分 量 | 成 分 | 分 量 |
|-------------------|-------|-----------------|---------------------|
| タウリン | 200mg | L-イソロイシン | 50mg |
| チアミン硝化物(ビタミンB₁) | 10mg | L-アルギニン塩酸塩 | 30mg |
| リボフラビン(ビタミンB₂) | 5mg | L-アスパラギン酸マグネシウム | 180mg |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) | 5mg | L-ヒスチジン塩酸塩水和物 | 6mg |
| L-バリン | 50mg | 無水リン酸水素カルシウム | 102mg(カルシウムとして30mg) |
| L-ロイシン | 100mg | | |

添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナウバロウ

[注意]

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

*受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho.co.jp/>