

リポビタン DX アミノ

- ◆リポビタン DX アミノには、生活者の疲労に寄り添ってきたリポビタンシリーズのベース処方であるタウリン、ビタミン B₁、B₂、B₆に加えて、BCAA*（バリン、ロイシン、イソロイシン）、アルギニンなどのアミノ酸、カルシウムを配合しています。1日1回の服用で日常生活の中で感じる「疲労」にすぐれた効果を発揮します。
*分岐鎖アミノ酸
- ◆加齢に伴う筋力の低下の改善・予防にも効果を発揮します。
- ◆特に「年齢とともに疲れやすくなった、筋力が低下してきた」と感じる中高年の方に、日々明るく元気に、アクティブに過ごすために活用していただきたい製品です。

効能

- ★疲労の回復・予防
- ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防
筋力の低下
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
肩・首・腰又は膝の不調
骨又は歯の衰え
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
筋力の低下
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
肩・首・腰又は膝の不調
- ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

成人（15才以上）、1回3錠、1日1回

15才未満、服用しないこと

注意

- ・定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- ・ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色の原因となり、品質が変わることがあります）
- ・びんの中の包装紙に包まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

成分

3錠中

タウリン 200mg

チアミン硝酸物（ビタミン B₁） 10mg

リポフラビン（ビタミン B₂） 5mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B₆） 5mg

L-バリン 50mg

L-ロイシン 100mg

L-イソロイシン 50mg

L-アルギニン塩酸塩 30mg

L-アスパラギン酸マグネシウム 180mg

L-ヒスチジン塩酸塩水和物 6mg

無水リン酸水素カルシウム 102mg（カルシウムとして 30mg）

添加物

無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナウバロウ

注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂ によるもので、ご心配ありません。

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹
消化器：胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。