

指定医薬部外品 販売名:リポビタンtt

服用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠 000	1日1回
15才未満	服用しないこと	

[注意](1)定められた用法・用量を厳守してください。(他
のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には
過剰摂取等に注意してください)(2)ぬれた手等で触れた
錠剤はびんに戻さないでください。(変色の原因となり、
品質が変わることがあります)(3)びんの中の包装紙に包
まれた物は乾燥剤ですので服用しないでください。

成 分 (3錠中)

タウリン 500mg、チアミン酢化物(ビタミンB1)10mg、リポ
フラビン(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン酢酸塩(ビタミン
B6)5mg、シアコバラミン(ビタミンB12)0.03mg、アスコ
ルビン酸カルシウム 100mg(ビタミンCとして82.6mg)、
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)10mg、カルニチン
塩化物 10mg、グリシン 5mg、サンヤク末 10mg、シソコ乾燥
エキス 8mg(シソコ 200mgに相当)
添加物:二酸化イタリ、白糖、ゼラチン、ラウリン酸ソルビタン、
タリク、グリセリン、脂肪酸エステル、無水ケイ酸、セルロース、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、酸化
チタン、ヒドロメロース、三酸化鉄、カルナウバロウ

[注意](1)本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少
異なることがあります。効果には変わりありません。(2)本剤の
服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中の
ビタミンB2によるもので、心配ありません。

QRコード

製品情報はこちら

開封 年 月 日

エコパッケージ
添付文書をなくし、紙の使用量を削減(従来品比)

キャップを開けた際、ビンのかもとの
シールが破れていたり、はがれている
場合は服用しないでください。

効 能

- ★疲労の回復・予防
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体が
だるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下
だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、前の不
調(肌荒れ、肌の乾燥)、冷えやすい・血行が悪い、目の疲れ
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の
改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重
い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠り
が浅い・血行が悪い、胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい
- ★病中病後の体力低下時、発熱に伴う消耗性疾患時、食欲
不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓
して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管
してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)使用期限を過ぎた製剤は服用しないでください。なお、
使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用して
ください。(品質保持のため)

(最初に服用する時に)
①瓶口シールをはがして捨ててください。②詰め物を取り
出して捨ててください。(この詰め物は輸送時の震動の
振動を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、
異物混入の原因になることがあります)

大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
https://www.taisho-direct.jp/

お問合せ先:大正製薬ダイヤレフト ☎0120-81-8428

製造番号
使用期限
(西暦年/月)

指定医薬部外品 90錠

疲労回復・栄養補給
**リポビタン
DXα**

開封口

QRコード

年齢とともに疲れやすくなった、
体力がなくなったと感じる方へ

エナジーサイクルに働きかけて、
からだ全体の疲れに効く

Q. 毎日飲んでいいですか?
A. 日々の疲労回復・予防などに
毎日服用いただけます。
*しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、
医師・薬剤師又は登録販売者に相談してください

Q. カフェインは入っていますか?
A. 入っていません。
寝る前にもおすすめです。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。皮膚:発疹/
消化器:胃部不快感 2. 服用後、次の症状が
あらわれることがあるので、このような症
状の持続又は増強が見られた場合には、服
用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください。下痢
3. しばらく服用しても症状がよくならない
場合は服用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

年齢とともに感じる日々の疲れに

タウリン配合

1日1回3錠で効く

小さくて
飲みやすい

指定医薬部外品

リポビタン
DXα 90錠

キャップ:PP ガラス:瓶
詰め物:PE 金庫:瓶口シール 紙箱

倍率見本 1.00倍