

LIPOVITAN DX α

- ◆LIPOVITAN DX α 는 평소 생활 속에서 느끼는 피로에 초점을 맞춰온 리포비탄 시리즈의 기본 처방인 타우린, 비타민 B₁, B₂, B₆ 뿐만 아니라 비타민 B₁₂, 비타민 C와 비타민 E, 카르니틴, 아미노산, 생약을 배합하고 있습니다. 1일 1회의 복용으로 일상 생활 속에서 느끼는 '피로'에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
- ◆일상생활에서 느끼는 영양불량에 따른 눈의 피로감과 혈액순환 개선 및 예방에 효과를 발휘합니다.
- ◆특히 '가령에 따른 피로, 체력 소모'를 느끼는 중장년층 분들께 매일 밝고 건강하게 활동적인 시간을 보낼 수 있도록 만든 제품입니다.

효능

- ★피로 회복 및 예방
- ★일상생활의 영양불량에 따른 몸 컨디션 개선 및 예방
쉽게 피로감을 느낀다 · 피로가 남는다 · 체력이 없다 · 몸이 무겁다 · 몸이 나른하다
어깨 · 머리 · 허리 또는 무릎 통증
숙취에 따른 식욕저하 · 나른함
잠이 잘 안온다 · 선잠을 잔다 · 잠이 잘 안 깬다
피부 트러블(피부거침, 피부 건조)
쉽게 몸이 차가워진다 · 혈액순환이 나쁘다
눈의 피로감
- ★체력, 신체저항력 또는 집중력 유지 및 개선
- ★허약체질(가령에 의한 신체허약을 포함한다.)에 따른 몸 컨디션 개선 및 예방
쉽게 피로감을 느낀다 · 피로가 남는다 · 체력이 없다 · 몸이 무겁다 · 몸이 나른하다
어깨 · 머리 · 허리 또는 무릎 통증
잠이 잘 안온다 · 선잠을 잔다 · 잠이 잘 안 깬다
피부 트러블(피부거침, 피부 건조)
몸이 쉽게 차가워진다 · 혈액순환이 나쁘다
위장이 약해 복통 및 설사를 하기 쉽다
- ★병중병후의 체력저하 시, 발열을 수반하는 소모성질환 시, 식욕부진 시, 임신 수유기 또는 산전산후 등의 영양보급

용법 및 용량

다음의 양을 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

성인 (15세 이상), 1회 3정, 1일 1회

15세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법 및 용량을 엄수해 주십시오. (다른 비타민 등을 함유하는 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)
- 젖은 손 등으로 만진 정제는 병에 다시 넣지 마십시오.(변색 등의 원인이 되며, 품질이 변할 수 있습니다)
- 병 속의 포장지로 감싼 것은 건조제이므로 복용하지 마십시오.

성분

3정중

타우린 500mg

초산토코페롤(비타민 E) 10mg

티아민 질산염(비타민 B₁) 10mg

카르니틴 염화물 10mg

리보플라빈(비타민 B₂) 5mg

글리신 5mg

피리독신 염산염(비타민 B₆) 5mg

산약 10mg

시아노코발라민(비타민 B₁₂) 0.03mg

가시오갈피 건조 추출액 8mg(가시오갈피 200mg 에 해당)

칼슘아스코베이트 100mg(비타민 C로서 82.6mg)

첨가물

이산화 규소, 백당, 젤라틴, 소르비탄라우레이트, 툴크, 글리세린 지방산 에스테르, 무수 규산, 셀룰로오스, 하이드록시프로필셀룰로오스, 마그네슘스테아레이트, 마크로골, 산화티탄, 하이프로멜로스, 산화제이철, 카르나우바 왁스

주의

- 본 약제는 생약을 원료로 사용하고 있으므로 제품에 따라 색조에 다소 차이가 있을 수 있으나, 효과는 변함이 없습니다.
- 본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
피부: 발진
소화기: 위부 불쾌감
- 복용 후 다음의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
설사
- 한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 6개월 이내에 복용하십시오.(품질유지를 위하여)

11

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.