

# LIPOVITAN ACTIVE

指定醫藥部外品

## 【使用上的注意事項】

### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：出疹 / 消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 若服用一段時間症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 【療效】

★恢復及預防疲勞 ★改善及預防虛弱體質（包括隨年齡增加而變得身體虛弱）引起的身體不適：容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、容易發冷、血液循環不佳、肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、皮膚狀況不佳（皮膚粗糙、皮膚乾燥）、胃腸虛弱，容易有腹痛及腹瀉、骨質及牙齒的衰退 ★改善及預防日常生活中因營養不良而引起的身體不適：因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞 ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力 ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

## 【用法及用量】

成人（15歲以上）1天1次1瓶（50mL）。

※未滿15歲請勿服用。

### [ 注意 ]

- 請務必遵守規定用法、用量。（若同時服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量）
- 本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。請充分搖勻後再服用。

## 【成分】1瓶（50mL）中

牛磺酸 .....	1500mg	硝酸硫胺（維生素 B <sub>1</sub> ） .....	5mg
蜂王漿 .....	200mg	核黃素磷酸鈉（維生素 B <sub>2</sub> ） .....	3mg
生薑流浸膏 .....	0.3mL	鹽酸吡哆辛（維生素 B <sub>6</sub> ） .....	5mg
	（相當於生薑 300mg）	菸鹼醯胺 .....	20mg
陳皮提取物 .....	20mg	肌醇 .....	50mg
	（相當於陳皮 100mg）	無水咖啡因 .....	50mg
當歸流浸膏 S .....	0.2mL		
	（相當於當歸 200mg）		

添加物：白糖、D-山梨醇、檸檬酸、檸檬酸鈉、普維酮、苯甲酸鈉、香料、酒精、甘油（酒精含量 0.20mL 以下）

### [ 注意 ]

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B<sub>2</sub> 的影響，無須擔憂。

## 【保管及使用上的注意事項】

- 請保管於陰涼處，避免日光直射。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

**【提供多語言產品資訊時的免責聲明】**

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。