

LIPOVITAN WALK

指定医药部外品

【使用注意事项】

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商
皮肤：皮疹/消化系统：胃部不适
- 服用后可能出现下述症状，若观察到这类症状持续或加剧，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商
腹泻
- 如果服用一段时间后症状仍未改善，请立即停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商

【功效】

- ★改善和预防因虚弱体质（包括随年龄增长出现的身体虚弱。）引起的身体不适：肩颈腰或膝盖不适、肌力下降、骨骼或牙齿衰退、易疲劳、疲劳持续、无体力、身体沉重、身体疲倦、皮肤不适（皮肤粗糙、皮肤干燥）
- ★改善和预防日常生活中因营养不良引起的身体不适：肩颈腰或膝盖不适、肌力下降、宿醉引起的食欲下降及疲倦感、眼睛疲劳
- ★维持和改善体力、身体抵抗力或注意力
- ★恢复和预防疲劳
- ★患病期间及患病后的体力下降时、伴有发热的消耗性疾病时、食欲不振时、孕期哺乳期或产前产后等的营养补充

【用法用量】

成人（15岁及以上）每日1次，每次1瓶（50mL）。

※未满15岁请勿服用。

【注意事项】

请严格遵守规定的用法用量。（同时服用含有其他维生素等的产品时，请注意不要过量摄入）

【成分】每瓶（50mL）中

牛磺酸.....	1500mg	硝酸硫胺素（维生素 B ₁ ）.....	5mg
硫酸软骨素钠.....	120mg	核黄素磷酸钠（维生素 B ₂ ）.....	10mg
L-缬氨酸.....	40mg	盐酸吡哆醇（维生素 B ₆ ）.....	10mg
L-亮氨酸.....	120mg	烟酰胺.....	20mg
L-异亮氨酸.....	50mg	肌醇.....	50mg
葡萄糖酸钙一水合物.....	700mg		

辅料：赤藻糖醇、乙酰磺胺酸钾、三氯蔗糖、精制甜菊提取物、柠檬酸、柠檬酸钠、pH 调节剂、没食子酸丙酯、苯甲酸、香料、甘油、维生素 E

【注意事项】

服用本品后，可能会出现尿液变黄的情况，这是由于本品中含有维生素 B₂引起的现象，无需担心。

【储存及操作注意事项】

- 请存放在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请存放在儿童触及不到的地方。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。

- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。