

指定医薬部外品 販売名:リポビタミンFH

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

【使用上の注意】**【相談すること】**1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。【成分】1本(50mL)中 タウリン 1500mg、グリシン 50mg、L-アスパラギン酸マグネシウム 100mg、チアミン硝化物(ビタミンB1) 5mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 10mg、ニコチン酸アミド 60mg、L-リシン塩酸塩 100mg、L-トレオニン 60mg 添加物：キシリトール、アセスルフアムK、スクラロース、精製ステビア抽出物、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸、香料、グリセリン 【注意】本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、心配ありません。

【効能】★虚弱体質(加齢による身体虚弱を言む)に伴う身体不調の改善・予防：寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥) ★疲労の回復・予防 ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給 ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 【用法・用量】成人(15才以上) 1日1回1本(50mL)を服用してください。※15才未満は服用しないでください。【注意】定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

大正製薬株式会社 <sup>11</sup>東京都豊島区高田3丁目24番1号 11客棟119番室 電話03-3985-1800

製造番号  
使用期限  
(西暦年月)

ガラス:瓶 50mL  
金属:キャップ  
★キャップと瓶は分別して捨ててください

指定医薬部外品



# リポビタミン ヨルリズム

## 年とともに気になる 睡眠の悩みを 改善\* ハンカフェイン

\*加齢による身体虚弱に伴う  
身体不調の改善:眠りが浅い・寝付きが悪い



【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり17kcal

DP-1A