

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

リポビタミンDプレミアム

販売名：リポビタミン DH

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効能】

- ★肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- ★滋養強壮
- ★虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成分】 100mL 中

タウリン	3000mg	リポフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	5mg
ローヤルゼリー	100mg	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	10mg
L-バリン	9mg	ニコチン酸アミド	20mg
L-ロイシン	12mg	イノシトール	100mg
L-イソロイシン	9mg	カルニチン塩化物	30mg
L-フェニルアラニン	8mg	無水カフェイン	50mg
L-トレオニン	6mg		
チアミン硝酸塩（ビタミン B ₁ ）	10mg		

添加物：ブドウ糖、トレハロース、白糖、アセスルファムK、精製ステビア抽出物、スクラロース、クエン酸 Na、pH 調整剤、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸 Na、カラメル、香料、グリセリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり 109kcal

大正製薬株式会社²¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話03-3985-1800

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—