

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

たまった疲れに 肉体疲労時の栄養補給

# リポビタミンFファイナルイー

販売名：リポビタミンF P  
指定医薬部外品

## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能】

★肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

★滋養強壮

★虚弱体質

## 【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

## 【成分】 100mL 中

タウリン	1500mg	チアミン硝化物（ビタミン B <sub>1</sub> ）	10mg
ローヤルゼリー	100mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B <sub>2</sub> ）	5mg
クコシ流エキス S	0.2mL （枸杞子 200mg に相当）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B <sub>6</sub> ）	5mg
セイヨウサンザシエキス S	12.5mg （西洋山査子 50mg に相当）	ニコチン酸アミド	20mg
		イノシトール	100mg
		無水カフェイン	50mg

添加物：エリスリトール、アセスルファム K、スクラロース、精製ステビア抽出物、クエン酸、クエン酸 Na、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸 Na、香料、ビタミン E、*l*-メントール、アルコール（アルコール 0.15mL 以下）

### 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり 11kcal

大正製薬株式会社<sup>1)</sup>

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
お客様119番室 電話03-3985-1800

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—