

LIPOVITAN GOLD V

◆消除疲勞・營業補給

療效

- ★恢復及預防疲勞
- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適：肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)、容易發冷、血液循環不佳、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞
- ★改善及預防虛弱體質(包括隨年齡增加而變得身體虛弱)引起的身體不適：腸胃虛弱，容易有腹痛及腹瀉、骨質及牙齒的衰退
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人(15歲以上)1天1次，每次1瓶(50mL)。
未滿15歲者，請勿使用。

注意事項

- ・請務必遵守規定用法、用量。(若服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量)
- ・本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。請充分搖勻後再服用。

成分

1枝(50mL)中
牛磺酸 1500mg
蜂王漿 200mg
生薑流浸膏 0.1mL(相當於生薑100mg)
杜仲葉萃取液 0.06mL(相當於杜仲葉60mg)
肉鹼鹽酸鹽 10mg
二氯乙酸二異丙胺 3mg
硝酸硫胺(維生素B₁) 5mg
核黃素磷酸鈉(維生素B₂) 3mg
鹽酸吡哆辛(維生素B₆) 5mg
菸鹼醯胺 20mg
無水咖啡因 50mg

添加劑

D-山梨醇，白糖，檸檬酸，檸檬酸鈉，普維酮，苯甲酸钠，焦糖，香料，甘油，香蘭素

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B₂的影響，無須擔憂。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹
消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- ・請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿服用超過使用期限的產品。

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。

- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。