

LIPOVITAN LOCOMO WALK

用于改善伴随年龄增长出现的 [肌力下降、膝盖及腰部的不适]

效能

- ★改善和预防虚弱体质（包括伴随年龄增长出现的身体虚弱）引起的身体不适：肩部、颈部、腰部以及膝盖的不适、肌力下降、骨骼和牙齿的衰弱、容易疲劳、疲劳累积、没有体力、身体沉重、身体疲倦、皮肤问题（皮肤粗糙、皮肤干燥）
- ★改善和预防日常生活中营养不良引起的身体不适：肩部、颈部、腰部以及膝盖的不适、肌力下降、宿醉引起的食欲不振及疲倦感、眼睛疲劳
- ★体力、身体抵抗力以及集中力的维持和改善
- ★疲劳的恢复和预防
- ★患病期间及患病后的体力不支时、伴随发热的消耗性疾病时、食欲不振时、孕期哺乳期以及产前产后等的营养补充

用法及用量

成年人（15岁以上），请按1天1次1支（50mL）服用。

未满15岁，不宜使用。

注意

请严格遵守规定的用法用量。（同时服用其他含有维生素等的产品时请注意不要过量摄取）

成分

1支（50mL）中

牛磺酸 1500mg

硫酸软骨素钠 120mg

L-缬氨酸 40mg

L-亮氨酸 120mg

L-异亮氨酸 50mg

葡萄糖酸钙水合物 700mg

硝酸硫胺（维生素 B₁） 5mg

核黄素磷酸钠（维生素 B₂） 10mg

吡哆醇盐酸盐（维生素 B₆） 10mg

烟酰胺 20mg

肌醇 50mg

添加剂

赤藓醇，乙酰磺胺酸钾，三氯蔗糖，甜叶菊提取纯化物，柠檬酸，柠檬酸钠，pH 调节剂，没食子酸丙酯，苯甲酸，香料，甘油，维生素 E

注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素 B₂ 引起的现象，因此不用担心。

使用注意事项

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹
消化系统：胃部不适
- 服用后有可能出现下述症状，如果这些症状持续或加重，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者
腹泻
- 持续服用一段时间仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。