

LIPOVITAN LOCOMO WALK

改善隨年齡增加而引致的 [肌肉無力、膝蓋及腰部不適]

療效

- ★改善及預防虛弱體質 (包括隨年齡增加而變得身體虛弱) 引起的身體不適: 肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、肌力低下、骨質及牙齒的衰退、容易疲倦、疲勞累積、失去體力、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳 (皮膚粗糙、皮膚乾燥)
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適: 肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、肌力低下、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞
- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★恢復及預防疲勞
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人 (15 歲以上) 1 天 1 次, 每次 1 瓶 (50mL)。

未滿 15 歲者, 請勿使用。

注意事項

請務必遵守規定用法、用量。(若服用其他含有維生素等的產品, 請注意不要攝取過量)

成分

1 枝 (50mL) 中

牛磺酸 1500mg

硫酸軟骨素鈉 120mg

L-α-胺基異戊酸 40mg

白氨酸 120mg

L-異白氨酸 50mg

葡萄糖酸鈣水合物 700mg

硝酸硫胺 (維生素 B₁) 5mg

核黃素磷酸鈉 (維生素 B₂) 10mg

鹽酸吡哆辛 (維生素 B₆) 10mg

菸鹼醯胺 20mg

肌醇 50mg

添加劑

赤蘚醇, 醋磺內酯鉀, 三氯蔗糖, 甜菊葉萃取精華, 檸檬酸, 檸檬酸鈉, pH 調節劑, 沒食子酸丙酯, 苯甲酸, 香料, 甘油, 維生素 E

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色, 此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響, 無須擔憂。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後, 出現下列症狀即可能為副作用影響, 請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚: 發疹
消化器官: 胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀, 如該症狀持續或加重時, 請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 持續服用一段時間症狀仍未見改善時, 請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。