

リポビタンゴールド V Royal

◆疲労回復・栄養補給

効能

- ★疲労の回復・予防
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、冷えやすい・血行が悪い、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ
- ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい、骨又は歯の衰え
- ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

注意

- ・定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- ・本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成分

1本（50mL）中

タウリン 1500mg

ローヤルゼリー抽出液 0.45mL（ローヤルゼリー300mgに相当）

生姜流エキス 0.3mL（ショウキョウ 300mgに相当）

オウセイ流エキス 0.24mL（オウセイ 240mgに相当）

クコシ流エキス-A 0.2mL（クコシ 200mgに相当）

トチュウ葉抽出液 0.06mL（トチュウヨウ 60mgに相当）

カルニチン塩化物 50mg

L-アルギニン塩酸塩 50mg

シクロピロキノンジイソプロピルアミン 10mg

チアミン硝化物（ビタミン B₁） 10mg

リポフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B₂） 5mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B₆） 10mg

ニコチン酸アミド 30mg

無水カフェイン 50mg

添加物

白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸 Na、ポビドン、安息香酸 Na、香料、アルコール、グリセリン、バニリン（アルコール 0.375mL 以下）

注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂ によるもので、ご心配ありません。

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹
消化器：胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- ・直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

- ・ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ・ 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・ 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・ 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・ 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・ 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。