

第2類医薬品

つらい疲れに
**リポビタミン
ゴールド**
エース タウリン
ビタミン
ローヤルゼリー
生薬

50mL

大正製薬 株式会社⁴¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

第2類医薬品

リポビタミンゴールド エース

【使用上の注意】
1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
【成分】1本(50mL)中 タウリン 1500mg、ローヤルゼリー 200mg、ニンジン流エキスB 90mg(人参 630mgに相当)、オウキ流エキスC 0.2mL(黄蘗 200mgに相当)、ハグキニン流エキス 0.2mL(巴戟天 200mgに相当)、アミノ酸化合物(ビタミンB1) 5mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 30mg、ニコチン酸アミド 20mg、イノシトール 100mg、馬水カプテン 50mg、添加物：白糖、D-ソルビトール、スクラロース、アセスルファムK、ポビドン、グリセリン、脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、安眠香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール、パニリン、ビタミンE (アルコール0.2mL以下)【注意】本製品の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、心配ありません。

【効能】★滋養強壮 ★虚弱体質 ★肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15才以上)1日1本(50mL)を服用してください。 ※15才未満は服用しないでください。【注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに皮膚を赤くすることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限過ぎた製品は服用しないでください。大正製薬(株)お客様119番 電話 03-3995-1800 1本あたり45kcal

製造番号

使用期限
(西暦年/月)

副作用被害救済制度
0120-149-931

NP1A

ガラス:瓶 金属:キャップ
★キャップの指は分別して捨ててください