

LIPOVITAN GOLD ACE

제2류 의약품(일반의약품)

⚠️ 【사용 시 주의사항】

상당



- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용이 발생할 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오
피부: 발진/소화기: 위 불쾌감
- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 증세가 심해지면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오
설사
- 얼마 동안 복용해도 증상이 좋아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오

【효능】

★자양 강장 ★허약 체질 ★육체 피로·아플 때나 아픈 후·식욕 부진·영양 불균형·발열성 및 소모성 질환·임신수유기 영양 보충

【용법·용량】

성인(15세 이상)은 하루 한 번 50mL(1병)씩 복용하십시오.

※15세 미만은 복용하지 마십시오.

【주의】

- 정해진 용법 및 용량을 반드시 지켜주십시오.
- 본 약제에는 생약 성분이 포함되어 있어 드물게 침전물이 생길 수 있지만 약효는 변함이 없습니다. 잘 흔들어 복용하십시오.

【성분】 1병(50mL) 중

타우린	1500mg	리보플라빈 인산에스테르나트륨(비타민 B ₂)	5mg
로열 젤리	200mg	피리독신 염산염(비타민 B ₆)	5mg
인삼 연조엑스-B	90mg	토코페롤 아세트산 에스테르(비타민 E)	30mg
	(인삼 630mg 상당)	니코틴산 아미드	20mg
황기류 추출물-C	0.2mL	이노시톨	100mg
	(황기 200mg 상당)	무수 카페인	50mg
파극천류 추출물	0.2mL		
	(파극천 200mg 상당)		
티아민 질산염(비타민 B ₁)	5mg		

첨가물: 백당, D-소르비톨, 수크랄로스, 아세실팜 K, 포비돈, 글리세린 지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌 경화 피마자유, 글리세린, 안식향산나트륨, 구연산, 구연산나트륨, 향료, 알코올, 바닐린, 비타민 E(알코올 0.2mL 이하)

【주의】

본 약제를 복용하면 소변이 노란색으로 변할 수 있지만 이것은 본 약제 중 비타민 B₂에 의한 것이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

【보관 및 취급 시 주의사항】

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

1개당 45kcal

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.