

LIPOVITAN GOLD ACE

第二類醫藥品

⚠【使用上的注意事項】

諮詢事項



- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹 / 消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 若服用一段時間症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

【療效】

★滋養強身 ★虛弱體質 ★身體疲勞、病中病後、食慾不振、營養障礙、發燒性消耗性疾患、懷孕哺乳期等的營養補充

【用法及用量】

成人（15 歲以上）1 天 1 次 1 瓶（50mL）。

※未滿 15 歲請勿服用。

【注意】

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。請充分搖勻後再服用。

【成分】1 瓶（50mL）中

牛磺酸	1500mg	核黃素磷酸鈉（維生素 B ₂ ）	5mg
蜂王漿	200mg	鹽酸吡哆辛（維生素 B ₆ ）	5mg
人參浸膏-B	90mg	生育酚醋酸酯（維生素 E）	30mg
（相當於人參 630mg）		菸鹼醯胺	20mg
黃耆流浸膏-C	0.2mL	肌醇	100mg
（相當於黃耆 200mg）		無水咖啡因	50mg
巴戟天流浸膏	0.2mL		
（相當於巴戟天 200mg）			
硝酸硫胺（維生素 B ₁ ）	5mg		

添加物：白糖、D-山梨醇、三氯蔗糖、醋磺內酯鉀、普維酮、脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯氫化蓖麻油、甘油、苯甲酸鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、香料、酒精、香蘭素、維生素 E（酒精含量 0.2mL 以下）

【注意】

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

【保管及使用上的注意事項】

- 請保管於陰涼處，避免日光直射。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

每瓶 45kcal

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。