

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

生薬、カルシウム・タウリン配合

リポビタミンJr.

リポビタミン Jr.

第3類医薬品

【使用上の注意】

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

☆小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

8～14才1日1回1本（50mL）を服用してください。

※8才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成分】 1本（50mL）中

ゴミシ流エキス…………… 0.2mL (五味子 200mg に相当)	カルニチン塩化物……………50mg
刺五加乾燥エキス……………16mg (刺五加 400mg に相当)	L-アスパラギン酸マグネシウム …… 100mg
グルコン酸カルシウム水和物……………123.75mg	チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）…………… 4mg
塩化カルシウム水和物……………55.5mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂) …………… 4mg
タウリン…………… 800mg	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）…………… 4mg
	ニコチン酸アミド……………15mg

添加物：白糖、還元麦芽糖水アメ、ポビドン、安息香酸、pH 調節剤、香料、グリセリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

大正製薬  株式会社⁸¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—