

效能或效果

☆儿童的发育期、偏食儿童、发热性消耗性疾病、病中病后、食欲不振、营养障碍等情况下的营养补充
滋补
虚弱体质

用法及用量

8~14岁，请按1天1次1支（50mL）服用
未满8岁，不宜服用
请严格遵守规定的用法用量。
儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
本药剂含有生药成分，偶尔会出现沉淀，但是药效没有变化。
请摇匀后服用。

成分及分量

50mL中
Schisandra Fruit Fluid Extract 0.2mL (equivalent to 200 mg of the crude drug)
Eleutherococcus Senticosus Rhizoma Dry Extract 16mg (equivalent to 400 mg of the crude drug)
Calcium Gluconate Hydrate 123.75mg
Calcium chloride 55.5mg
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 800mg
Carnitine Hydrochloride 50mg
Magnesium L-aspartate 100mg
Thiamine Nitrate 4mg
Riboflavin sodium phosphate 4mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 4mg
Nicotinamide 15mg

添加剂

Sugar,Reduced maltose syrup,Povidone ,Benzoic acid,pH adjusting agent,flavor,Glycerin

成分及分量相关注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B2引起的现象，因此不用担心

使用注意事项**禁止事项**

服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹
消化系统：
胃部不适
服用后有可能出现下述症状，如果这些症状持续或加重，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者
腹泻
持续服用一段时间仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
请保管在儿童无法触及的地方。
请勿服用超过使用期限的产品。

81

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任