

服用时请仔细阅读本盒的说明书。

LIPOVITAN DX M

指定准药品



【使用注意事项】

咨询事项



- 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本盒咨询医生、药剂师或注册销售商
皮肤：皮疹/消化系统：胃部不适
- 服用后可能出现下述症状，若观察到这类症状持续或加剧，请停止服用，并携带本盒咨询医生、药剂师或注册销售商
腹泻
- 如果服用一段时间后症状仍未改善，请停止服用，并携带本盒咨询医生、药剂师或注册销售商

【功效】

★恢复和预防疲劳★改善和预防因虚弱体质（包括随年龄增长出现的身体虚弱。）引起的身体不适：肌力下降、易疲劳、疲劳持续、无体力、身体沉重、身体疲倦、肩颈腰或膝盖不适、骨骼或牙齿衰退★维持和改善体力、身体抵抗力或注意力★改善和预防日常生活中因营养不良引起的身体不适：肌力下降、易疲劳、疲劳持续、无体力、身体沉重、身体疲倦、肩颈腰或膝盖不适★患病期间及患病后体力下降时、伴有发热的消耗性疾病时、食欲不振时、孕期哺乳期或产前产后等的营养补充

【用法用量】

请用水或温水服用以下剂量。

年龄	1 次量	服用次数
成人（15 岁以上）	3 片	每天 1 次
未满 15 岁	请勿服用	

【注意事项】

- 请严格遵守规定的用法用量。（同时服用含有其他维生素等的产品时，请注意不要过量摄入）
- 请勿将湿手等触摸过的片剂放回瓶中。（否则会导致变色，出现变质）
- 瓶中包装纸内的包裹物为干燥剂，请勿服用。

【成分】 3 片中

牛磺酸	200mg	L-异亮氨酸	50mg
硝酸硫胺素（维生素 B ₁ ）	10mg	L-精氨酸盐酸盐	30mg
核黄素（维生素 B ₂ ）	5mg	L-天冬氨酸镁	180mg
盐酸吡哆醇（维生素 B ₆ ）	5mg	L-组氨酸盐酸盐水合物	6mg
L-缬氨酸	50mg	无水磷酸氢钙	102mg
L-亮氨酸	100mg	（以钙计为 30mg）	

辅料：无水硅酸、纤维素、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、滑石粉、聚乙二醇、二氧化钛、羟丙甲纤维素、三氧化二铁、巴西棕榈蜡

【注意事项】

服用本品后，可能会出现尿液变黄的情况，这是由于本品中含有维生素 B₂ 引起的现象，无需担心。

【储存及操作注意事项】

- (1) 请在避免阳光直射、潮气小的阴凉处密封保存。
- (2) 请存放在儿童触及不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会造成误用或变质）
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在 6 个月内服用。（为保证质量）

<首次服用时>

- ① 请在撕开瓶口密封物后丢弃。
- ② 请取出填充物后丢弃。（此填充物用于预防运输时片剂破损。如取出再放入瓶子，可能会造成异物混入）

-正文为包装（产品盒）上记载的事项-

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。