

LIPOVITAN DXM

指定醫藥部外品

⚠【使用上的注意事項】

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本包裝盒諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹 / 消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀有持續或加劇之情形，請停止服用，並攜帶本包裝盒諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 若服用一段時間症狀未見改善，請停止服用，並攜帶本包裝盒諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

【療效】

★恢復及預防疲勞 ★改善及預防虛弱體質（包括隨年齡增加而變得身體虛弱）引起的身體不適：肌力低下、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、骨質及牙齒的衰退 ★維持及改善體力、抵抗力及集中力 ★改善及預防日常生活中因營養不良而引起的身體不適：肌力低下、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適 ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、懷孕哺乳期或產前產後等的營養補給

【用法及用量】

請以冷開水或溫水服用以下的量。

年齡	1 次量	服用次數
成人（15 歲以上）	3錠	1天1次
未滿 15 歲	不可服用	

[注意]

- 請務必遵守規定用法、用量。（若同時服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量）
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色而影響品質）
- 瓶內以包裝紙包覆之物為乾燥劑，請勿服用。

【成分】3錠中

牛磺酸	200mg	L-異白胺酸	50mg
硝酸硫胺（維生素 B ₁ ）	10mg	L-精氨酸鹽酸鹽	30mg
核黃素（維生素 B ₂ ）	5mg	L-天門冬氨酸鎂	180mg
鹽酸吡哆辛（維生素 B ₆ ）	5mg	L-組氨酸鹽酸鹽	6mg
L-纈胺酸	50mg	無水磷酸氫鈣	102mg
L-白胺酸	100mg		（鈣為 30mg）

添加物：二氧化矽、纖維素、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、滑石、聚乙二醇、二氧化鈦、羥丙甲纖維素、氧化鐵、巴西棕櫚蠟

[注意]

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂的影響，無須擔憂。

【保管及使用上的注意事項】

- (1)請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- (2)請保管於兒童無法觸及之處。
- (3)請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4)請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。(這是為了確保品質)

〈初次服用時〉

- ①請撕開瓶口的封膜並丟棄。
- ②請取出填充物並丟棄。(填充物為防止運送過程錠劑破損之用。若將此填充物取出後又再次放入瓶中，可能導致異物混入)

—本文件係包裝(產品的盒子)上所記載之事項—

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。