

LIPOVITAN CLEAR

지정 의약품

【사용 시 주의사항】

상담

- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용이 발생할 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오.
피부: 발진/소화기: 위 불쾌감
- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 증세가 심해지면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오.
설사
- 얼마 동안 복용해도 증상이 좋아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 제품을 들고 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오.

【효능】

☆체력, 신체 저항력 또는 집중력 유지·개선 ☆피로 회복·예방 ☆허약체질(노화로 인한 신체 허약 포함)에 따른 신체 부진 개선·예방: 뼈 또는 치아 약화 ☆일상 생활에서 영양 부족으로 인한 신체 부진 개선·예방: 어깨·목·허리 또는 무릎 상태가 좋지 않음, 쉽게 피로·피로감이 남음·체력 부족·몸이 무거움·몸이 늘어짐, 피부 상태가 좋지 않음(거칠음, 피부 건조), 숙취로 인한 식욕 저하·늘어짐, 눈의 피로 ☆질병 중 또는 병후의 체력 저하 시, 발열을 동반한 소모성 질환 시, 식욕 부진 시, 임신 수유기 또는 산전·산후의 영양 보충

【용법·용량】

성인(15 세 이상)은 하루 한 번 50mL(1 병)씩 복용하십시오.

※15 세 미만은 복용하지 마십시오.

【주의】

- 정해진 용량·용량을 반드시 준수하십시오. (다른 비타민이 함유된 제품을 동시에 복용할 경우에는 과잉 섭취에 주의하십시오.)
- 이 약제에는 생약 성분이 포함되어 있어 드물게 침전물이 생길 수 있지만 약효는 변함이 없습니다. 잘 흔들어 복용하십시오.

【성분】1 병(50mL) 중

타우린..... 1500mg	티아민 질산염(비타민 B ₁)10mg
구기자류 농축액-A.....0.2mL (구기자 200mg 상당)	리보플라빈 인산에스터나트륨(비타민 B ₂)5mg
로열 젤리300mg	피리독신 염산염(비타민 B ₆).....10mg
카르니틴 염화물50mg	니코틴산아미드.....30mg
가시오갈피류 농축액0.2mL (가시오갈피 200mg 상당)	이노시톨100mg
	무수 카페인.....50mg

첨가물: 백당, D-소르비톨, 수크랄로스, 포비돈, 안식향산나트륨, 구연산나트륨, 구연산, pH 조절제, 향료, 알코올, 글리세린, 바닐린
(알코올 0.2mL 이하)

【주의】

이 약제를 복용하면 소변이 노란색으로 변할 수 있는데 이것은 이 약제 속의 비타민 B₂ 로 인한 것이므로 안심하시기 바랍니다.

【보관 및 취급 시 주의사항】

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

(3)사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.