

LIPOVITAN CLEAR

指定醫藥部外品

【使用上的注意事項】

諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹 / 消化器官：胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 若服用一段時間症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

【療效】

☆維持及改善體力、抵抗力及集中力 ☆恢復及預防疲勞 ☆改善及預防因虛弱體質（包括隨年齡增加而變得身體虛弱。）引起的身體不適：骨質及牙齒的衰退 ☆改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適：肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳（皮膚粗糙、皮膚乾燥）、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞 ☆病中病後的體力低下時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、懷孕哺乳期或產前產後等的營養補給

【用法及用量】

成人（15歲以上）1天1次1瓶（50mL）。

※未滿15歲請勿服用。

【注意】

- 請務必遵守規定用法、用量。（若同時服用其他含有維生素等的產品，請注意不要攝取過量）
- 本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。請充分搖勻後再服用。

【成分】1瓶（50mL）中

牛磺酸.....	1500mg	硝酸硫胺（維生素 B ₁ ）.....	10mg
枸杞子流浸膏-A	0.2mL	核黃素磷酸鈉（維生素 B ₂ ）.....	5mg
（相當於枸杞子 200mg）		鹽酸吡哆辛（維生素 B ₆ ）.....	10mg
蜂王漿.....	300mg	菸鹼醯胺	30mg
肉鹼鹽酸鹽.....	50mg	肌醇	100mg
刺五加流浸膏.....	0.2mL	無水咖啡因.....	50mg
（相當於刺五加 200mg）			

添加物：白糖、D-山梨醇、三氯蔗糖、普維酮、苯甲酸钠、檸檬酸鈉、檸檬酸、pH 調節劑、香料、酒精、甘油、香蘭素
（酒精含量 0.2mL 以下）

【注意】

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

【保管及使用上的注意事項】

- 請保管於陰涼處，避免日光直射。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。

- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。