

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	テイシ防風通聖散																		
2	成分・分量	<p>1 日量(12 錠) 中 防風通聖散エキス(16/25 量) 3520 mg</p> <table border="0"> <tr> <td>トウキ 0.768g</td> <td>シャクヤク 0.768g</td> <td>センキュウ 0.768g</td> </tr> <tr> <td>サンシシ 0.768g</td> <td>レンギョウ 0.768g</td> <td>ハッカ 0.768g</td> </tr> <tr> <td>ショウキョウ 0.256g</td> <td>ケイガイ 0.768g</td> <td>ボウフウ 0.768g</td> </tr> <tr> <td>マオウ 0.768g</td> <td>ダイオウ 0.96g</td> <td>無水ボウショウ 0.48g</td> </tr> <tr> <td>ビャクジュツ 1.28g</td> <td>キキョウ 1.28g</td> <td>オウゴン 1.28g</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ 1.28g</td> <td>セッコウ 1.28g</td> <td>カッセキ 1.92g</td> </tr> </table> <p>の抽出乾燥エキス末</p>	トウキ 0.768g	シャクヤク 0.768g	センキュウ 0.768g	サンシシ 0.768g	レンギョウ 0.768g	ハッカ 0.768g	ショウキョウ 0.256g	ケイガイ 0.768g	ボウフウ 0.768g	マオウ 0.768g	ダイオウ 0.96g	無水ボウショウ 0.48g	ビャクジュツ 1.28g	キキョウ 1.28g	オウゴン 1.28g	カンゾウ 1.28g	セッコウ 1.28g	カッセキ 1.92g
トウキ 0.768g	シャクヤク 0.768g	センキュウ 0.768g																		
サンシシ 0.768g	レンギョウ 0.768g	ハッカ 0.768g																		
ショウキョウ 0.256g	ケイガイ 0.768g	ボウフウ 0.768g																		
マオウ 0.768g	ダイオウ 0.96g	無水ボウショウ 0.48g																		
ビャクジュツ 1.28g	キキョウ 1.28g	オウゴン 1.28g																		
カンゾウ 1.28g	セッコウ 1.28g	カッセキ 1.92g																		
3	用法・用量	次の量を 1 日 3 回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。 成人(15 才以上) 1 回 4 錠、7 才～14 才 1 回 3 錠、 5 才～6 才 1 回 2 錠、5 才未満 服用しないこと																		
4	効能・効果	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症： 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症																		
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください <ul style="list-style-type: none"> 他の瀉下薬(下剤) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 胃腸が弱く下痢しやすい人。 発汗傾向の著しい人。 高齢者。 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>																		
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項																			

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。