

# TEISHI BOFUTSUSHOSAN

## 效能

体力充沛，腹部皮下脂肪多，容易便秘的下列各种病症：  
伴有心悸，肩膀酸痛，上火，浮肿，便秘，脓肿（鼻窦炎），湿疹，皮炎，粉刺，肥胖症的高血压和肥胖

## 用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：

成年人（15岁以上），1天3次，1次4片

7岁~14岁，1天3次，1次3片

5岁~6岁，1天3次，1次2片

未满5岁，不宜服用

## 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

## 成分

1天量（12片）中

防风通圣散精华（16/25量）3520 mg

（当归 0.768g，芍药 0.768g，川芎 0.768g，栀子 0.768g，连翘 0.768g，薄荷 0.768g，生姜粉 0.256g，肉桂 0.768g，防风 0.768g，麻黄 0.768g，大黄 0.96g，无水芒硝 0.48g，白术提取物 1.28g，桔梗 1.28g，黄芩 1.28g，甘草 1.28g，石膏 1.28g，滑石 1.92g）干提取物粉

## 添加剂

二氧化硅，滑石，硬脂酸镁，纤维素，羟丙甲纤维素，聚乙二醇，巴西棕榈蜡

## 注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要服用下述医药品  
其他泻下药（泻药）
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群  
孕妇或有可能已怀孕的人群  
身体虚弱人群（体力不足、身体虚弱的人群）。  
肠胃虚弱，容易腹泻的人群。  
冒汗倾向明显的人群。  
老年人  
此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。  
拥有以下症状的人群  
浮肿，排尿困难  
接受以下诊断的人群  
高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹、发红，发痒  
消化系统：恶心、呕吐，食欲不振，胃部不适，腹部胀满感，伴随剧烈腹痛的腹泻，腹痛  
精神神经系统：头晕  
其他：冒汗，心悸，浮肿，头痛
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。  
间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肠系膜静脉硬化症：长期服用导致腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状反复出现。

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
腹泻，便秘
- 如果服用 1 个月左右（便秘服用 1 周左右）症状仍未好转，请停止服用，并拿着本说明书向医生、药剂师或注册销售者咨询
- 若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
- 请勿服用超过使用期限的产品。且，即使在服用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

11

### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。