

TEISHI BOFUTSUSHOSAN

療效

體力充沛，腹部皮下脂肪多，容易便秘的下列各種病症：

高血壓和肥胖引起的心悸，肩膊酸痛，上火，浮腫，便秘，膿腫（鼻竇炎），濕疹，皮膚發炎，粉刺，肥胖症

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

成人（15歲以上），1天3次，1次4片

7歲~14歲，1天3次，1次3片

5歲~6歲，1天3次，1次2片

未滿5歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分

1天用量（12片）中

防風通聖散精華（16/25量） 3520 mg

（當歸 0.768g，芍藥 0.768g，川芎 0.768g，山梔子 0.768g，連翹 0.768g，薄荷 0.768g，生薑粉 0.256g，桂皮 0.768g，防風 0.768g，麻黃 0.768g，大黃 0.96g，無水芒硝 0.48g，白朮萃取物 1.28g，桔梗 1.28g，黃芩 1.28g，甘草 1.28g，石膏 1.28g，滑石 1.92g）乾燥萃取物粉末

添加劑

二氧化矽，滑石，硬脂酸鎂，纖維素，羥丙甲纖維素，聚乙二醇，巴西棕櫚蠟

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。
其他瀉下藥（瀉藥）
- 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
身體虛弱的人（體力衰弱的人、體弱的人）。
胃腸弱，容易腹瀉的人。
發汗傾向顯著的人。
年長者。
之前曾因藥品等，引發發疹・發紅、發癢等的人。
有下列症狀的人。
浮腫，排尿困難
接受過下列診斷的人。
高血壓，心臟病，腎臟病，甲狀腺功能障礙
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢
消化器官：噁心、嘔吐，食欲不振，胃部不適感，腹部膨脹感，伴隨劇烈腹痛的腹瀉，腹痛
精神神經系統：頭暈
其他：發汗，心悸，浮腫，頭痛
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腸繫膜靜脈硬化症：因長期服用，反覆出現腹痛、腹瀉、便秘、腹部膨脹等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或加劇時，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者腹瀉，便秘
- 如果服用 1 個月左右（便秘服用 1 周左右）症狀仍未改善，請停止服用，並攜同本說明書向醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早服用完畢。（為確保品質）

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。