

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

本草八味地黄丸料エキス錠-H

第2類医薬品 〈漢方薬〉

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください

- (1)胃腸の弱い人。
- (2)下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能、用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

効能

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	3錠	1日3回
7才～14才	2錠	
7才未満	服用しないこと	

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

詰め物を取り出して捨ててください。

(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)

成分

1日量(9錠)中

八味地黄丸エキス (1/2量) 2.2g

シ	オ	ウ	……	2.5g	プ	ク	リ	ョ	ウ	……	1.5g
サ	ン	シ	ュ	……	1.5g	ポ	タ	ン	ピ	……	1.5g
サ	ン	ヤ	ク	……	1.5g	ケ	イ	ヒ	……	0.5g	
タ	ク	シ	ャ	……	1.5g	プ	シ	末	……	0.5g	

より抽出

添加物：セルロース、CMC-Ca、炭酸Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg

【注意】

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)

この製品についてのお問い合わせは、下記に
お願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元 11

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho-direct.jp/>

製造販売元

本草製薬株式会社

名古屋市中天白区古川町125番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)