

# HONZO HACHIMIJIIOGANRYO EXTRACT TABLETS-H

## 效能

体力中度以下，易疲劳，四肢易冷，尿量减少或多尿，有时有口渴的下列疾病：下肢痛、腰痛、麻木、老年人眼花、痒、排尿困难、残尿感、夜间尿、尿频、浮肿、高血压伴发症状的改善（肩膀酸痛、头重、耳鸣）、轻微漏尿

## 用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15 岁以上，1 天 3 次，1 次 3 片

7 岁~14 岁，1 天 3 次，1 次 2 片

未满 7 岁，不宜服用

## 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

## 成分

1 天量（9 片）中

八味地黄丸精华（1/2 量）2.2 g

（地黄 2.5g, 山茱萸 1.5g, 山药 1.5g, 泽泻 1.5g, 茯苓 1.5g, 牡丹皮 1.5g, 桂皮 0.5g, 附子粉 0.5g）从中抽取

## 添加剂

纤维素, CMC-Ca, 碳酸钙, 硅酸铝镁, 交联羧甲基纤维素钠, 硬脂酸镁

## 注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群不要服用

肠胃虚弱人群。

容易腹泻的人群。

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群  
孕妇或有其可能性的人群  
严重上火，面色通红且体力充沛的人群。  
此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹、发红，发痒  
消化系统：食欲不振，胃部不适，腹痛  
其他：心悸，上火，嘴唇、舌头发麻
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
腹泻
- 若服用 1 个月左右后症状仍无改善时请停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
- 请勿服用超过使用期限的产品。且，即使在服用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。