

HONZO HACHIMIJIIOGANRYO EXTRACT TABLETS-H

효능

체력 중등도 이하로 쉽게 피곤해지고, 사지가 차가워지기 쉽고, 소변량 감소 또는 다뇨에, 때로는 구갈이 있는 사람의 다음 증상 : 하지통, 요통, 저림, 고령자의 침침한 눈, 가려움증, 배뇨 곤란, 잔뇨감, 야간뇨, 빈뇨, 부종, 고혈압에 따른 수반 증상의 개선(어깨 결림, 두중, 이명), 가벼운 요실금

용법 및 용량

다음의 양을 식전 또는 식간에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

15 세 이상, 1 회 3 정, 1 일 3 회

7 세~14 세, 1 회 2 정, 1 일 3 회

7 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.
- 젖은 손 등으로 만진 정제는 병에 다시 넣지 마십시오.(변색 등의 원인이 되며, 품질이 변할 수 있습니다.)

성분

In daily dose (9 tablets)

팔미지황환 추출물 (1/2 량) 2.2g

(지황 2.5g, 산수유 1.5g, 산약 1.5g, 택사 1.5g, 복령 1.5g, 목단피 1.5g, 계피가루 0.5g, 부자가루 0.5g) 에서 추출 첨가물

셀룰로오스, CMC-Ca, 탄산칼슘, 메타규산알루미늄산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 마그네슘스테아레이트

주의

본제는 생약을 원료로 사용하고 있으므로 제품에 따라 색조 등에 다소 차이가 있을 수 있으나, 효과는 변함 없습니다.

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

- 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것

위장이 약한 사람.

설사하기 쉬운 사람.

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

상기되기 쉽고 얼굴이 붉으며 체력이 충실한 사람

지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람.

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

피부:발진·발적, 가려움

소화기:식욕 부진, 위부 불쾌감, 복통

기타:두근거림, 어지러움, 입술·혀의 저림

- 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

설사

- 1 개월 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는습기가 적은 서늘한 곳에밀전하여 보관할 것.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 복용하십시오.(품질유지를 위하여)

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.