

HONZO HACHIMIJIIOGANRYO EXTRACT TABLETS-H

療效

體力中度以下，易疲勞，四肢易冷，尿量減少或多尿，有時有口渴的下列疾病：下肢痛、腰痛、發麻、老年人眼花、發癢、排尿困難、殘尿感、夜間尿、尿頻、浮腫、高血壓伴發症狀的改善（肩膊酸痛、頭重、耳鳴）、輕微漏尿

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

15 歲以上，1 天 3 次，1 次 3 片

7 歲~14 歲，1 天 3 次，1 次 2 片

未滿 7 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分

1 天用量（9 片）中

八味地黃丸精華（1/2 量）2.2 g

（地黃 2.5g，山茱萸 1.5g，山藥 1.5g，澤瀉 1.5g，茯苓 1.5g，牡丹皮 1.5g，桂皮 0.5g，附子粉 0.5g）從中抽取

添加劑

纖維素，CMC-Ca，碳酸鈣，矽酸鋁鎂，交聯羧甲基纖維素鈉，硬脂酸鎂

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 下列的人請勿服用

胃腸弱的人。

容易腹瀉的人。

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
氣火上逆，臉色紅潤，體力充足的人。
之前曾因藥品等，引發發疹・發紅、發癢等的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢
消化器官：食欲不振，胃部不適感，腹痛
其他：心悸，上火，口唇、舌頭痠麻
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使服用 1 個月左右，症狀仍未改善的情況下，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早服用完畢。（為確保品質）

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。

- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。