

HONZO DAISAIKOTO EXTRACT TABLETS H

效能

体力充沛、从侧腹到胸口有闷重感、有便秘倾向的人士的以下各种症状：胃炎、习惯性便秘、高血压和肥胖引起的肩膀酸痛、头痛、便秘、神经官能症、肥胖症

用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用。

15 岁以上，1 次 4 片，1 天 3 次

5 岁~14 岁，1 次 3 片，1 天 3 次

未满 5 岁，请勿服用

两餐之间服用时，以餐后 2~3 小时为准。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。(有可能会成为变色等原因，导致质量改变)
- 初次服用时请把瓶内的填充物取出扔掉。
(此填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。如果将填充物取出后再次放回瓶中，则可能会导致混入异物)

成分

12 片中

大柴胡汤提取物 (1/2 量) 1.70g

(柴胡液提取物 3.00g, 半夏 2.00g, 黄芩 1.50g, 芍药 1.50g, 大枣 1.50g, 枳实 1.00g, 大黄 1.00g, 生姜 0.75g)

从中抽取

添加剂

纤维素，碳酸钙，硅酸铝镁，交联羧甲基纤维素钠，硬脂酸镁

注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变。

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

- 在服用本药剂期间，不要服用下述医药品
其他泻下药 (泻药)
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
身体虚弱人群 (体力不足、身体虚弱的人群)。
肠胃虚弱，容易腹泻的人群。
此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红、发痒
消化系统：伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸 (皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
腹泻
- 如果服用 1 个月左右 (用于习惯性便秘、高血压或肥胖引起的便秘时为 5~6 天) 症状仍无改善，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。另外，即使在使用期限内，开封后请尽早服用。(为了保证质量)

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。