

# 本草大柴胡湯エキス錠-H

## 効能

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

15才以上、1回4錠、1日3回

5才～14才、1回3錠、1日3回

5才未満、服用しないこと

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします。

## 注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）
- 最初に服用する時に詰め物を取り出して捨ててください。  
（この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります）

## 成分

12錠中

大柴胡湯エキス（1/2量） 1.70g

（サイコ 3.00g、ハンゲ 2.00g、オウゴン 1.50g、シャクヤク 1.50g、タイソウ 1.50g、キジツ 1.00g、ダイオウ 1.00g、ショウキョウ 0.75g）より抽出

## 添加物

セルロース、炭酸 Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、クロス CMC-Na、ステアリン酸 Mg

## 注意

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。  
妊婦又は妊娠していると思われる人。  
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
胃腸が弱く下痢しやすい人。  
今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ  
消化器：はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。  
間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。  
肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢

- 1ヵ月位（常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 保管及び取扱い上の注意

- ・ 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ・ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ・ 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・ 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。（品質保持のため）

11

#### 【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・ 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・ 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・ 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・ 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。