

HONZO DAISAIKOTO EXTRACT TABLETS H

療效

體力充足卻胸脇苦滿，有便秘傾向之外同時具以下症狀：胃炎、習慣性便秘、高血壓或肥胖所伴隨而來的肩膀痠痛 / 頭痛 / 便秘、神經症、肥胖

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用。

15 歲以上，1 次 4 錠，1 天 3 次

5 歲~14 歲，1 次 3 錠，1 天 3 次

未滿 5 歲者，請勿服用

餐間服用時，約以餐後 2~3 小時為宜。

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。(可能造成變色等影響品質)
- 最初服用時，請將填充物取出並丟棄。
(填充物為防止運送過程錠劑破損之用。若將此填充物取出後又再次放入瓶中，可能導致異物混入)

成分

12 片中

大柴胡湯萃取物 (1/2 量) 1.70g

(柴胡 3.00g, 半夏 2.00g, 黃芩 1.50g, 芍藥 1.50g, 大棗 1.50g, 枳實 1.00g, 大黃 1.00g, 生薑 0.75g) 從中抽取

添加劑

纖維素，碳酸鈣，矽酸鋁鎂，交聯羧甲基纖維素鈉，硬脂酸鎂

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變。

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品
其他瀉下藥 (瀉藥)
- 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
身體虛弱的人 (體力衰弱的人、體弱的人)。
胃腸弱，容易腹瀉的人。
之前曾因藥品等，引發發疹·發紅、發癢等的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹、發紅、搔癢
消化器官：伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短·呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右 (習慣性便秘、高血壓或肥胖所伴隨而來的便秘則為 5~6 天) 症狀仍未改善，請停止服用，攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。

- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早服用完畢。(為確保品質)

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。