

メイトリート・メイトリートクリーム購入前チェック 1

メイトリート及びメイトリートクリームは、カンジダによる感染症を治療するOTC医薬品です。本製品を購入する前に以下の「チェック項目」を確認してください。

① 以下に示したような場合は、自己判断が難しい、カンジダによる感染症でない可能性がある、他の基礎疾病が潜んでいる可能性がある等の理由より、本剤を使用してはいけないため、次の項目がひとつでも「YES」に該当する場合は、必ず医師の診断を受けてください。

- | | Yes | No |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ● 今回のような症状が出たのは初めてですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 年齢は15歳未満又は60歳以上ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 妊婦又は妊娠していると思われるか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 膣カンジダ症の症状以外に次の症状がありますか？
発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色がついた又は血に染まった又は魚臭いおりもの、生理停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 糖尿病の診断を受けていますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● ワルファリン等の抗凝血剤を服用していますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 本疾病を頻繁に繰り返していますか？
(1~2ヵ月に1回又は6ヵ月以内に2回以上) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 膣カンジダの再発ではないと思われませんか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 他の感染症の可能性がありますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 患部は膣又はその周辺以外ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● ミコナゾール硝酸塩製剤でアレルギー症状を起こしたことがありますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1つでもYESがある場合医師の診断を受けてください。

② 以下の項目がすべて「NO」の場合
② 以下の場合に該当するかさらに確認してください。

- (1) 医師の治療を受けている場合
(2) 本人又は家族がアレルギー体質である場合
(3) 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある場合
(4) 授乳中である場合

該当する 該当しない

医師又は薬剤師に
相談してください。

チェック2の質問に
答え適切な剤型を
選択して下さい。



すべてNOの場合次の質問へ
お進みください。 ②へ

チェック 2

以前、医師により膣カンジダの診断・治療を受けた時と膣又は外陰部の症状が同じですか？

No 他の感染症や下着やナプキンのむれ・刺激によるかゆみなど、別の原因が考えられます。膣カンジダの再発かどうかわかりませんので、本剤を使用せず、医師の診断を受けてください。

Yes あなたの症状や部位により適切な製品(剤型)を選んでください。

あてはまる症状はどれですか？ (あてはまるところに○)	あなたの場合の適切な剤型 (適切な剤型に○)
膣*にカンジダ症状がある <input type="checkbox"/> 外陰症状はないか 外陰病変は膣口部 のみの狭い範囲に 認められる	メイトリート (膣坐剤) を使用してください
膣*及び外陰**に カンジダ症状がある <input type="checkbox"/> 外陰病変は膣口部 より広い範囲に 認められる	メイトリート (膣坐剤)と メイトリートクリーム を併用してください
外陰**に カンジダ症状がある <input type="checkbox"/> 外陰病変は膣口部 より広い範囲に 認められ (膣症状はない)	メイトリートクリーム (外陰用クリーム) を使用してください +併用 メイトリート(膣坐剤) との併用が望まれます ※膣内にも原因菌が増殖して いる可能性があるため、 膣坐剤の併用が望まれます。

*おりもの、熱感、かゆみ等
**発疹を伴うかゆみがあらわれた場合 1) 発赤、ただれ等、皮膚にみられる変化のことをいいます。
☆メイトリートクリームは外陰症状(発疹を伴うかゆみ)があらわれた場合にお使いください。
ご不明な点がありましたら、薬剤師に相談してください。