

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	メディリートクリーム
2	成分・分量	1g中 ミコナゾール硝酸塩 10mg
3	用法・用量	成人（15歳以上60歳未満）、1日2～3回、適量を患部に塗布してください。ただし、 <u>3日間</u> 使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。 (1) 外陰部症状のみの場合：本剤を使用してください。腔剤（腔に挿入する薬）との併用が望まれます。 (2) 腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合：本剤に腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください。
4	効能・効果	腔カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）ただし、腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合は、必ず腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 初めて発症したと思われる人。 (2) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 15歳未満又は60歳以上の人。 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、腔からの不規則又は異常な出血、腔又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 (6) 次の診断を受けた人。 糖尿病 (7) ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。 (8) 本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～2ヵ月に1回又は6ヵ月以内に2回以上） (9) 腔カンジダの再発かわからない人。 2. 次の部位には使用しないでください 腔周辺（外陰）以外の部位。 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・授乳中の人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装	10g
----	-----

#### 〈商品特長〉

- ◆メディトリートクリームは、ミコナゾール硝酸塩を主成分とした外陰用の治療薬です。
- ◆ミコナゾール硝酸塩は、膣カンジダの原因であるカンジダ菌を殺菌し、膣カンジダによる諸症状を改善します。
- ◆メディトリートクリームは、膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみに効果を発揮します。