

2017年2月

大正製薬株式会社

メディトリートクリーム 使用上の注意改訂のお知らせ

メディトリアートの使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。
つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い
申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）
<p>■してはいけないこと</p> <p>①次の人は使用しないでください (1)～(6)（略）</p> <p>(7)本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～ 2 ヶ月に 1 回又は 6 ヶ月以内に 2 回以上）</p> <p>(8)腔カンジダの再発かわからない人。（自己 判断できない場合は、医師の診断を受ける 必要があります）</p>	<p>■してはいけないこと</p> <p>①次の人は使用しないでください (1)～(6)（略）</p> <p>(7)ワルファリン等の抗凝血剤を服用してい る人。（ワルファリンの作用である出血傾 向が強くなる場合があります）</p> <p>(8)本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～ 2 ヶ月に 1 回又は 6 ヶ月以内に 2 回以上）</p> <p>(9)腔カンジダの再発かわからない人。（自己 判断できない場合は、医師の診断を受ける 必要があります）</p>

以上